

ماذا لو كان هناك رد فعل خطير؟

5

ما الذي يجب أن أبحث عنه؟

- ابحث عن أي شيء يقلقك، مثل علامات الارتكاس التحسسي الحاد، ارتفاع حاد في درجة الحرارة، أو سلوك غير عادي. يمكن أن تشمل دلائل حدوث رد فعل تحسسي شديد تواجه البثور، تورم في الوجه والحلق، صعوبة في التنفس، سرعة ضربات القلب، والدوخة، والضعف. وتداء تلك الأعراض بعد بضع دقائق إلى بضع ساعات بعد التطعيم.

ماذا على أن أفعل؟

- إذا كنت تعتقد أنها حالة رد فعل حساسية شديدة أو غير ذلك من حالات الطوارئ التي لا يمكن السكوت عليها، اتصل بالرقم 9-1-1 وقم بنقل الشخص إلى أقرب مستشفى. وبخلاف ذلك، قم بالاتصال بطبيبك.
- ينبغي الإبلاغ عن ردود الفعل الناتجة عن تلقى لقاح ما إلى نظام الإبلاغ عن الآثار الضارة للقاح (VAERS). ينبعي أن يقوم طبيبك بتقديم هذا التقرير، أو يمكنك أن تفعل ذلك بنفسك من خلال موقع VAERS على شبكة الإنترنت www.vaers.hhs.gov أو عن طريق الاتصال بالهاتف رقم 1-800-822-7967.

إن نظام الإبلاغ عن الآثار الضارة للقاح VAER لا يوفر المشورة الطبية.

برنامج التعويض الوطني للإصابات الناجمة عن تلقى اللقاح

6

إن البرنامج الوطني للتعويض عن إصابات اللقاح (VICP) برنامج فرالي تم إنشاؤه لتعويض الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا قد أصيبوا نتيجة لتلقيهم بعض اللقاحات.

يمكن للأشخاص الذين يعتقدون أنهم قد أصيبوا نتيجة تلقى لقاح ما التعرف على البرنامج وعلى كيفية تقديم المطالبة عن طريق الاتصال بالهاتف رقم 1-800-338-2382 أو زيارة الموقع البرامج www.hrsa.gov/vaccinecompensation هناك حد زمني لتقديم المطالبة بالتعويض.

كيف يمكنني معرفة المزيد؟

7

- اسأل طبيبك، حيث يمكنه أن يعطيك/يمكنها أن تعطيك رزمة اللقاح أو أن يدرج/تدرج أو يشير/تشير إلى مصادر أخرى للمعلومات.
- اتصل بدائرة الصحة المحلية أو بدائرة الصحة في الولاية.
- اتصل بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC): 1-800-232-4636 أو www.cdc.gov/flu
- اتصل بالرقم (1-800-CDC-INFO)
- قم بزيارة موقع www.cdc.gov/vaccinecompensation

مخاطر حدوث رد فعل لتلقي اللقاح

4

كما هو الحال مع أي دواء، بما في ذلك اللقاحات، هناك فرصة لحدوث ردود فعل عكسية. وعادة ما تكون ردود الفعل تلك خفيفة وتزول لوحدها، ولكن من الممكن حدوث ردود فعل خطيرة أيضا.

لا تحدث لمعظم الناس الذين يتلقون لقاح الأنفلونزا أي مشاكل.

تشمل المشاكل الطفيفة التي تعقبأخذ لقاح الأنفلونزا ما يلي:

- التقرح والوجع، الاحمرار، أو تورم مكان إعطاء اللقاح
- بحة في الصوت
- فرحة وأحمرار أو حكة في العينين
- السعال
- الحمى
- الأوجاع
- الصداع
- الحكة
- التعب

في حالة حدوث هذه المشاكل، عادة ما تبدأ باكرا بعد تلقى اللقاح وتستمر لمدة يوم واحد أو يومين.

يمكن أن تشمل المشاكل الأكثر خطورة التي تعقب تلقى لقاح الأنفلونزا ما يلي:

- قد يكون هناك خطر ضئيل في زيادة الإصابة بمتلزمة غيان باريه (GBS) بعد تلقى لقاح الأنفلونزا المعطل. وقد تم تقدير احتمال حدوث هذه المخاطر بحدوث حالة إضافية واحدة أو حالتين إضافيتين لكل مليون شخص يجري تطعيمهم. ويعتبر ذلك أقل بكثير من خطر حدوث مضاعفات الأنفلونزا شديدة، والتي يمكن منع حدوثها بالتطعيم بلقاح الأنفلونزا.
- قد يكون الأطفال الصغار الذين يتلقون لقاح الأنفلونزا مع لقاح المكورات الرئوية (PCV13) وأو لقاح DTaP في نفس الوقت أكثر عرضة بشكل قليل للإصابة بذبة ناجمة عن الحمى. اسأل طبيبك للحصول على المزيد من المعلومات. أخبر طبيبك إذا كان الطفل الذي يتم تطعيمه بلقاح الأنفلونزا قد أصيب بالذبة في أي وقت مضى.

المشاكل التي يمكن أن تحدث بعد حقن أي لقاح:

- ينبغي على الناس أحياناً بعد تعرضهم لإجراء طبي، بما في ذلك التطعيم، يمكن أن يساعد الجلوس أو الاستلقاء لمدة 15 دقيقة في منع الإغماء والإصابات الناجمة عن السقوط.
- أخبر طبيبك إذا كنت تشعر بالدوار أو لديك تغيرات في الرؤية أو طنين في الأذنين.
- يصاب بعض الناس بألم شديد في الكتف ويصعب عليهم تحريك الذراع الذي أعطي فيه اللقاح. يحدث ذلك بشكل نادر جدا.
- يمكن أن يتسبب أي دواء في رد فعل تحسسي شديد.
- إن حدوث مثل ردود الفعل هذه بسبب تلقي اللقاح نادر جدا، ويقدر احتمال حدوثها بحوالي 1 لكل مليون جرعة، ويمكن أن تحدث خلال بضع دقائق إلى بضع ساعات بعد التطعيم.

وكما هو الحال مع أي دواء، هناك فرصة ضئيلة للغاية لأن يتسبب لقاح بإصابة خطيرة أو وفاة.

يجري رصد سلامة اللقاحات دائمًا. الحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع www.cdc.gov/vaccinesafety/



بيان إعلامي عن لقاح

Many Vaccine Information Statements are available in Arabic and other languages. See www.Immunize.org/vis

تتوفر العديد من بيانات معلومات حول اللقاح بالأسبانية وغيرها من اللغات الأخرى.
انظر الموقع www.Immunize.org/vis

لقاح الانفلونزا (Flu) (معطل أو مؤتلف) ما تحتاج إلى معرفته

لماذا يتعينأخذ اللقاح؟

من المواد الحافظة التي تحتوي على المطهر الزيتي الذي يسمى ثيبروسال. لم تظهر الدراسات أن وجود الثيبروسال في اللقاحات ضار، ولكن تتوفر لقاحات انفلونزا لا تحتوي على ثيبروسال. لا يوجد فيروس الانفلونزا الحي في لقاحات الانفلونزا، وهي لا يمكن أن تسبب الانفلونزا.

هناك العديد من فيروسات الانفلونزا، وهي دائماً ما تتغير. يتم تركيب لقاح انفلونزا جديد كل عام للحماية من ثلاثة أو أربع فيروسات يحتمل أن تسبب المرض في موسم الانفلونزا القادم. ولكن حتى عندما لا يتتطابق اللقاح مع هذه الفيروسات تماماً، فإنه يمكن أن يكون قادرًا على توفير بعض الحماية.

لا يمكن أن يمنع اللقاح ما يلي:

- الانفلونزا التي يسببها فيروس لا يشمله اللقاح، أو
- الأمراض التي تبدو مثل مرض الانفلونزا، ولكنها ليست كذلك. يستغرق تطوير الحماية حوالي أسبوعين (2 أسبوع) بعد التطعيم، وتستمر الحماية خلال موسم الانفلونزا.

1 لماذا يتعينأخذ اللقاح؟

إن الانفلونزا مرض معدي ينتشر في جميع أنحاء الولايات المتحدة كل عام، وعادة ما يكون ذلك بين شهرى تشرين الأول/أكتوبر وأيار/مايو.

يحدث مرض الانفلونزا بواسطة فيروسات الانفلونزا، وتنتشر أساساً عن طريق السعال والعطس والتلافس الوثيق.

ويمكن لأي شخص أن يصاب بالانفلونزا. تحدث الإصابة بالانفلونزا فجأة ويمكن أن تستمر لعدة أيام. وتختلف الأعراض حسب العمر، ولكن يمكن أن تشمل ما يلي:

- الحمى/نوبات القشعريرة
- احتقان في الحلق
- آلام العضلات
- التعب
- السعال
- الصداع
- سيلان أو انسداد الأنف

يمكن أن تؤدي الانفلونزا أيضاً إلى التهابات رئوية والتهابات الدم، وأن تسبب الإسهال والنوبات لدى الأطفال. إذا كانت لديك حالة طبية مثل أمراض القلب أو الرئة، يمكن أن تجعل الانفلونزا الأمور أسوأ.

تكون الانفلونزا أكثر خطورة بالنسبة لبعض الناس. يعتبر الرضع والأطفال الصغار، والناس من عمر 65 سنة وأكبر والنساء الحوامل، والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية معينة أو من ضعف الجهاز المناعي هم الأكثر تعرضاً للخطر.

يموت الآلاف من الناس في الولايات المتحدة كل عام بسبب الانفلونزا، ويتم نقل آخرين كثيرين إلى المستشفى.

- يمكن أن يؤدي لقاح انفلونزا لما يلي:
- منع إصابتك بالانفلونزا،
 - جعل الانفلونزا أقل حدة إذا أصبت بها، و
 - منع انتشار عدو إصابتك بالانفلونزا العائلك وغيرهم من الناس.

2 لقاحات الانفلونزا المعطلة والمولففة

يوصى بجرعة من لقاح الانفلونزا لكل موسم انفلونزا. وقد يحتاج الأطفال من سن 6 أشهر إلى 8 سنوات من العمر إلى جرعتين خلال نفس موسم الانفلونزا، بينما يحتاج جميع الأشخاص الآخرين إلى جرعة واحدة فقط في كل موسم انفلونزا.

تحتوي بعض لقاحات الانفلونزا المعطلة على كمية صغيرة جداً