

Cuando "Enfermo" es "Demasiado Enfermo para Venir a la Escuela"

Estas son algunas pautas para ayudarle a decidir cuándo su estudiante necesita quedarse en casa en vez de ir a la escuela:

1. Fiebre de más de 100.5 °F - (se queda en casa hasta 24 horas después de la fiebre se resuelve sin la ayuda de medicamentos para bajar la fiebre)
2. La diarrea frecuente - (3 o más deposiciones sueltas dentro de un período de 8 horas), especialmente si se acompaña de fiebre o si las heces contienen sangre o moco. Para los niños que usan pañales las heces debe estar contenido en el pañal para venir a la escuela. Para los niños entrenados de tocador deben tener el control de su intestino y ser capaz de utilizar el inodoro apropiadamente
3. Vómito – 2 o más veces en 24 horas (se queda en casa hasta 24 horas después de la última vómito)
4. Erupción – está extendiendo o acompañada de fiebre o cambio de comportamiento
5. 5. El dolor severo u otros síntomas que impiden al niño de concentrarse o participar en las actividades de clase – Pregunta: “¿Va a ser capaz de participar en las actividades de aula regular a pesar de sus síntomas actuales?”

En caso de duda – ¡llámenos y estaremos encantados de ayudarle a elegir la mejor opción para su hijo! Si su estudiante ve a un médico, recuerde que debe obtener una nota médica – esto es excusado diferentemente y puede ayudar a evitar problemas de absentismo escolar si su estudiante está enfermo por más de unos pocos días.

Paula Kodesh, RN
(715) 234-8065 x 5192
Enfermera de las escuelas primarias

Trisha Neuser, RN
(715) 234-8156 x 5110
Enfermera de la Middle School y High School

Cuando "Enfermo" es "Demasiado Enfermo para Venir a la Escuela"

Estas son algunas pautas para ayudarle a decidir cuándo su estudiante necesita quedarse en casa en vez de ir a la escuela:

1. Fiebre de más de 100.5 °F - (se queda en casa hasta 24 horas después de la fiebre se resuelve sin la ayuda de medicamentos para bajar la fiebre)
2. La diarrea frecuente - (3 o más deposiciones sueltas dentro de un período de 8 horas), especialmente si se acompaña de fiebre o si las heces contienen sangre o moco. Para los niños que usan pañales las heces debe estar contenido en el pañal para venir a la escuela. Para los niños entrenados de tocador deben tener el control de su intestino y ser capaz de utilizar el inodoro apropiadamente
3. Vómito – 2 o más veces en 24 horas (se queda en casa hasta 24 horas después de la última vómito)
4. Erupción – está extendiendo o acompañada de fiebre o cambio de comportamiento
5. 5. El dolor severo u otros síntomas que impiden al niño de concentrarse o participar en las actividades de clase – Pregunta: “¿Va a ser capaz de participar en las actividades de aula regular a pesar de sus síntomas actuales?”

En caso de duda – ¡llámenos y estaremos encantados de ayudarle a elegir la mejor opción para su hijo! Si su estudiante ve a un médico, recuerde que debe obtener una nota médica – esto es excusado diferentemente y puede ayudar a evitar problemas de absentismo escolar si su estudiante está enfermo por más de unos pocos días.

Paula Kodesh, RN
(715) 234-8065 x 5192
Enfermera de las escuelas primarias

Trisha Neuser, RN
(715) 234-8156 x 5110
Enfermera de la Middle School y High School

